

## 伏尾溫泉(一號泉)

- (1) 性質 無色透明,些微金屬味接近無味,呈弱鹼性。
- (2) 氫離子濃度(PH) 8.4
- (3) 氫梨子含有量(礦水1公升中) 42.66,  
(百億分之1(Ci)) 11.73M.E.
- (4) 泉質 依前述數值,斷定本溫泉為放射能泉,  
屬暖和低張冷礦泉。
- (5) 效用及入浴禁忌

### 溫泉入浴效用

- (1) 風濕
- (2) 痛風等尿酸引起的疾病
- (3) 動脈硬化(42度以下溫浴)
- (4) 高血壓(42度以下溫浴)
- (5) 慢性肝硬化,膽道疾病

### 禁止入浴者

- (1) 發熱性疾病患者
- (2) 結核病、惡性腫瘤患者
- (3) 重度心臟病、出血性疾病、高度貧血患者
- (4) 有明顯發病不適狀況者
- (5) 懷孕初期、後期者

### 溫泉飲用效用

- (1) 痛風等尿酸引起的疾病
- (2) 痛風
- (3) 慢性消化疾病
- (4) 慢性肝硬化,膽道疾病
- (5) 糖尿病

### 禁止飲用者

- (1) 腎臟發炎及腎臟病患者
- (2) 高血壓患者
- (3) 有水腫傾向者

### 溫泉氣體吸入效用

- (1) 痛風等尿酸引起的疾病
- (2) 風濕
- (3) 慢性支氣管炎

## 伏尾溫泉(二號泉)

- (1) 性質 無色透明,些微金屬味,澀味接近無味,呈弱鹼性。
- (2) 氫離子濃度(PH) 8.4
- (3) 氫梨子含有量(礦水1公升中) 29.55,  
(百億分之1(Ci)) 8.13M.E.
- (4) 泉質 依前述數值,斷定本溫泉為含食鹽小蘇打泉,  
屬暖和低張冷礦泉。
- (5) 效用及入浴禁忌

### 溫泉入浴效用

- (1) 創傷燒燙傷
- (2) 皮膚搔癢、角化症
- (3) 風濕

### 禁止入浴者

- (1) 慢性疾病及發熱性疾病患者
- (2) 結核病、惡性腫瘤患者
- (3) 重度心臟病、出血性疾病、高度貧血患者
- (4) 有明顯發病不適狀況者
- (5) 懷孕初期、後期者
- (6) 高度動脈硬化極高血壓患者不可浸泡高溫浴  
(42度以上)

### 溫泉飲用效用

- (1) 痛風等尿酸引起的疾病
- (2) 慢性肝硬化,膽道疾病
- (3) 糖尿病
- (4) 慢性消化器官疾病
- (5) 肥胖症
- (6) 慢性尿道疾病
- (7) 蕁麻疹

### 溫泉氣體吸入效用

- (1) 慢性支氣管炎
- (2) 咽喉炎

### 禁止吸入者

- (1) 呼吸道結核患者